

composita, corollae fauce barbata, laciniis rotundatis (Rheede Hort. Malab. I, t. 45).

Crescit: in sylvis humilioribus Javae.

Floret: omni tempore.

Nomen: Lameh.

Variet. foliis cuneato-oblongis obtusis, umbellis effusis.

Crescit: ad pedem montis Salak.

ALSTONIA SPECTABILIS, R. Brown.

A: foliis verticillatis 4-6-nis oblongis obtuse acuminatis basi attenuatis glabris, umbellis terminalibus compositis consertis, corollae fauce parum barbata, laciniis obtusis tubo corollae semibreviribus.

Crescit: in montosis Parang.

Floret: Augusto, etc.

Nomen: Lameh.

Variet. a. bantamensis. foliis cuneato-oblongis obtusiusculis, umbella terminali simplici.

Crescit: in montanis Provinciae Bantam.

ALSTONIA SPATULATA, Bl.

A: foliis breviter petiolatis oppositis verticillatisve 4-nis spatulatis apice rotundatis glabris, floribus subumbellatis terminalibus, fauce corollae subbarbata, laciniis obtusis tubo corollae subaequibus.

Cres-

Crescit: circa Rompien.

Floret: Aprili, etc.

Nomen: Lameli.

ALSTONIA VILLOSA, Bl.

A: foliis subsessilibus verticillatis quaternis elliptico-oblongis utrinque acutiusculis remote costatis infra villosis, cymis effusis terminalibus.

Crescit: ad monticulos calcareos Kuripan.

Floret: Novembri, etc.

ALSTONIA SERICEA, Bl.

A: foliis verticillatis ternis quaternisve lanceolatis utrinque acuminatissimis transverse lineatis intra sericeo-pubescentibus, cymis consertis terminalibus, sauce corollae barbata, laciis lanceolatis acuminatis.

Crescit: in montosis Salak.

Floret: Aprili, etc.

ECHITES, Linn. R. Brown.

Calix parvus, quinquepartitus. *Corolla* hypocrateriformis aut infundibuliformis; sauce nuda; limbo quinquepartito, torto. *Stamina* inclusa aut exserta. *Antherae* sagittatae aut lanceolatae, stigmati adhaerentes. *Ovarium* didymum. *Stylus* didymus. filiformis. *Stigma* subconicum, apice emarginatum. *Squa-*