

indivisis, panicula terminali divaricata, floribus glomerulatis subsessilibus bibracteatis.

*Crescit*: in cultis et in sylvis montis Salak spontaneam.

*Floret*: Septembri, etc.

*Nomen*: Kanarie (Batav.); Kituwok (Sund.).

*CANARIUM PIMELA*, Koen.

*C*: foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis integerrimis glabris, stipulis nullis, racemis subterminalibus (casu foliorum) aggregatis, floribus fasciculatis nudis.

*Crescit*: in sylvis montanis Javae occidentalis.

*Floret*: Aprili, etc.

*Nomen*: Kituak.

*CANARIUM DENTICULATUM*, Bl.

*C*: foliis pinnatis, foliolis elliptico-oblongis acuminatis superne obsolete denticulatis glabriusculis, stipulis amplexicaulibus laciniatis, paniculis subterminalibus (casu foliorum), floribus glomerulatis subsessilibus bibracteolatis.

*Crescit*: in sylvis montium Salak, Parang, etc.

*Floret*: Decembri.

*Nomen*: Kipella.



• • Stamina disco villosa ad marginem imposita.

*CANARIUM HISPIDUM*, Bl.

*C*: foliis pinnatis, foliolis oblongis acuminatis basi passim subcordatis inaequaliteribus integerrimis infra fructibusque hispidulis, stipulis petiolaribus exiguis, racemis subterminalibus (casu foliorum) aggregatis, floribus subfasciculatis nudis.

*Crescit*: in montosis Provinciarum Buitenzorg et Bantam.

*Floret*: Decembri — Martio.

*Nomen*: Surian.

*Var. scabrum*. foliis majoribus infra scabris, racemis compositis.

*Crescit*: ad montem Salak.

*Floret*: Octobri.

*Nomen*: Biru.

*CANARIUM ALTISSIMUM*, Bl.

*C*: foliis pinnatis, foliolis (majusculis) oblongis cuspidatis basi subcordatis integerrimis utrinque pilosiusculis - barbato - ciliatis, stipulis petiolaribus exiguis subulatis, racemis axillaribus simplicibus, fructibus hispidis.

*Crescit*: in montosis Parang.

*Floret*: Januario, etc.

*Nomen*: Kiharpan.