

- affinis, etiam differt costa foliorum infra plerumque purpurascente venaque marginali simplici).

*Crescit*: in Javae altis montium plerumque ad ortum fluviorum.

*Floret*: Junio, etc.

*Nomen*: Kupa dessa.

### *MYRTUS ACUMINATISSIMA*, Bl.

*M*: soliis lanceolatis acuminatissimis tenuiter venosis coriaceis glabris, paniculis terminalibus corymbosis, pedicellis subtrifloris, calicibus subintegerrimis (petalis 5-6 minutis).

*Crescit*: in montosis.

*Floret*: Novembri.

*Nomen*: Kijingkan; Kigingan; ipsi Kuliet.

### *MYRTUS MAGNOLIAEFOLIA*, Bl.

*M*: soliis elliptico - oblongis apice obtusis basi angustatis coriaceis venosis glabris, paniculis terminalibus axillarisve, floribus subternis sessilibus, calicibus subintegerrimis.

*Crescit*: in sylvis montis Burangrang.

*Floret*: Junio, etc.

### *MYRTUS CARYOPHYLLUS*, Bl.

*M*: soliis oblongo-lanceolatis temuiter parallelo-venosis nitidis glabris, corymbo terminali, calicibus quadratis, ovariis elongatis.

*Syn.* *Caryophyllus aromaticus*, Linn.

*Cresc*