

Arbor 50-50 ped. alt. Folia alterna, oblonga, integerrima, exstipulacea, basi infra plerumque biglandulosa. Racemi axillares et laterales, solitarii aut conferti, tomentosi. Flores parvi, unibracteati.

*POLYDONTIA ARBOREA*, Bl.

*Crescit*: in sylvis montosis Javae occidentalis.

*Floret*: Septembri — Decembri.

*Nomen*: Kitumbilah.

*POTENTILLA*, Linn.

Tormentilla et Comarum, Linn.

*Calix* inferus, duplici ordine quinario decempartitus. *Petala* quinque rarins quatuor, calici inserta. *Stamina* plura, ibidem inserta. *Ovaria* plurima, receptaculo convexo imposita, 1-ovulata. *Styli* laterales. *Akenia* exsucca, receptaculo sicco imposita. *Embryonis* radícula supera.

*POTENTILLA JAPONICA*, Bl.

*P*: flagellis decumbentibus, foliis radicalibus pinnatis subtrijugis (cum impari) strigoso-villosis, caulibus ternatis, foliolis obovatis argente serratis, externis majoribus approximatis, stipulis apice trifidis.

*Crescit*: ex Japonia sub nomine *P. magna*, Thunberg. a Cl. v. Siebold accepti.

*FRAGARIA*, Linn.

Duchesnea, Smith.

*Calix* inferus, duplici ordine quinario decempartitus. *Petala* quinque, calici inserta. *Stamina* plura,

ibi-