

*STEMONURUS SECUNDIFLORUS*, Bl.

*S:* foliis oblongis acutis basi angustatis coriaceis glabris aveniis, spicis apice 3-4-fidis, floribus secundis (arbor 40 ped.).

*Crescit:* in sylvis montium Salak et Gede.

*Floret:* Decembri.

*Nomen:* Kimeong.

*STEMONURUS JAVANICUS*, Bl.

*S:* foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis glabris venosis, cymis solitariis geminisve densifloris.

*Crescit:* in sylvis montanis Provinciae Buitenzorg.

*Floret:* Martio.

*Nomen:* Kitongerret.

*Variet.* foliis ovalibus utrinque acuminatis submembranaceis glabris, junioribus ad costam infra puberis, cymis dichotomis solitariis (an species?).

*Crescit:* in sylvis insulae Nusae Kambangae.

*Floret:* Novembri, etc.

SECT 2. ANACOLOSA.

Filamenta in praefloratione erecta, haud exserta.

*STEMONURUS FRUTESCENS*, Bl.

*S:* foliis elliptico-oblongis obtuse acuminatis basi acutis venosis glabris ad costam subtus puberulis, pedunculis confertis unifloris.

*Cres-*